

# こどもの予防接種

**予防接種を受ける時の注意** 母子健康手帳と予診票・子ども医療証など住所が確認できるものがないと接種できませんので必ずご持参ください。(母子健康手帳には氏名・住所を必ず記入しておいてください。)

- 裏面(4ページ)に掲載の各医療機関へ直接電話し、予約した上で接種してください。
- 転入・紛失等で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って健康増進課まで取りにきてください。
- 予防接種を受ける前に必ず接種ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
- 当日の朝の体温をはかり、体調をよく確認しておいてください。
  - ★急性疾患に罹患した場合は、麻しんは治癒後4週間程度、風しん・おたふくかぜ・水痘については、治癒後2~4週間程度の間隔をあけてください。
  - ★けいれんを起こしたことがある方は、必ずかかりつけの医師と事前に相談してください。
  - ★長期入院等で予防接種ができない場合は、健康増進課へご相談ください。



予防接種の種類		対象者	標準的な接種間隔・接種期間など				接種回数	ワクチンの種類	
ロタ	ロタリックス	生後6週から生後24週まで	1 回目	標準：生後2か月 原則：27日以上	2 回目	標準：生後24週まで	2回	経口生ワクチン	
	ロタテック	生後6週から生後32週まで	1 回目	標準：生後2か月 原則：27日以上	2 回目	標準：27日以上 3 回目	3回		
ヒブ (細菌性髄膜炎)	接種開始月齢： 生後2か月以上7か月未満	1 回目	標準：27日~56日 原則：27日以上	2 回目	標準：27日~56日 原則：27日以上	3 回目	標準：7か月以上 13か月未満 原則：7か月以上	追加	不活化ワクチン
	接種開始月齢： 生後7か月以上1歳未満	1 回目	標準：27日~56日 原則：27日以上	2 回目	標準：7か月以上13か月未満 原則：7か月以上	追加	追加		
	接種開始年齢： 1歳以上5歳未満	5歳の誕生日の前日まで				1回			
小児用肺炎球菌 (細菌性髄膜炎)	接種開始月齢： 生後2か月以上7か月未満	1 回目	27日以上	2 回目	27日以上	3 回目	60日以上	追加	不活化ワクチン
	接種開始月齢： 生後7か月以上1歳未満	1 回目	27日以上	2 回目	60日以上	追加	追加		
	接種開始年齢： 1歳以上2歳未満	1 回目	60日以上			追加	追加		
	接種開始年齢： 2歳以上5歳未満	5歳の誕生日の前日まで				1回			
B型肝炎	1歳未満	1 回目	標準：生後2か月 原則：27日以上	2 回目	原則：139日以上		3 回目	3回	
四種混合(DPT-IPV) (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	生後2か月以上 7歳6か月未満	1 回目	標準：20日~56日 原則：20日以上	2 回目	標準：20日~56日 原則：20日以上	3 回目	標準：12か月以上 18か月未満 原則：6か月以上	追加	4回
BCG(結核)	1歳未満	生後5か月から生後8か月まで				1回			
水痘	1歳以上3歳未満	1 回目	標準：6か月以上12か月未満 原則：3か月以上			2 回目		2回	注射生ワクチン
MR (麻しん風しん混合)	1期	1歳以上2歳未満	2歳の誕生日の前日まで				1回		不活化ワクチン
	2期	H29.4.2~H30.4.1 生まれの方	小学校入学前の1年間：令和5年4月1日~令和6年3月31日				1回		
日本脳炎 ※1	1期	3歳以上7歳6か月未満	1 回目	標準：6日~28日 原則：6日以上	2 回目	標準：おおむね1年 原則：6か月以上	追加	3回	
	2期	9歳以上13歳未満	小学4年生				1回		
DT(ジフテリア 破傷風混合)	11歳以上13歳未満	小学6年生				1回		不活化ワクチン	
子宮頸がん予防ワクチン ※2	小学6年生から高校1年生 相当の年齢の女子	サバリックス (2価)	1 回目	標準：1か月 原則：1か月以上	2 回目	原則：2か月半以上	3 回目	3回	
		ガードシル (4価)	1 回目	標準：2か月 原則：1か月以上	2 回目	原則：3か月以上	3 回目		

※1 日本脳炎予防接種の勧奨差し控えにより、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ(20歳未満)で未接種分がある方は、特例対象者となりますので、健康増進課までお問い合わせください。  
 ※2 シルガード9(9価)の接種間隔・回数は健康増進課までお問い合わせください。

## 【予防接種ワクチンの種類と接種間隔】

<b>不活化ワクチン</b> ・ヒブ ・B型肝炎 ・日本脳炎 ・子宮頸がん予防ワクチン ・インフルエンザ ・小児用肺炎球菌 ・四種混合 ・DT	<b>経口生ワクチン</b> ・ロタ <b>注射生ワクチン</b> ・BCG ・MR ・水痘 ・おたふくかぜ
---	--

①「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。  
 ②同一ワクチンを2回以上接種する場合の間隔は、それぞれの「接種間隔」の欄を参照してください。